



Nincsenek tünetek
(köhögés, láz vagy
légzési nehézségek)



Nincs utazási előzmény az
érintett területekre vagy
kontaktus fertőzött személyekkel

- Nyugtassuk meg a beteget
- SARS Co-V-2 fertőzés valószínűsége igen kicsi
- Emeljük ki a preventív intézkedések fontosságát
- Biztosítsunk bizonyítékon alapuló információt és tanácsot (szóban és/vagy írásban)



Vannak tünetek
(köhögés, láz vagy
légzési nehézségek)



Nincs utazási előzmény az
érintett területekre vagy
kontaktus fertőzött személyekkel

- Nyugtassuk meg a beteget
- SARS-CoV-2 fertőzés valószínűsége kicsi
- Emeljük ki a preventív intézkedések fontosságát
- Biztosítsunk bizonyítékon alapuló információt és tanácsot (szóban és/vagy írásban)



Nincsenek tünetek
(köhögés, láz vagy
légzési nehézségek)



Van utazási előzmény az
érintett területekre vagy
kontaktus fertőzött személyekkel

- Nyugtassuk meg a beteget
- SARS-CoV-2 fertőzés kockázata fennáll
- Emeljük ki a preventív intézkedések fontosságát és tanácsoljunk 14 napos otthon tartózkodást (karantént)
- Térképezzük fel, kikkel lépett kapcsolatba az érintett
- Biztosítsunk bizonyítékon alapuló információt és tanácsot (szóban és/vagy írásban)
- Amennyiben az utazást, vagy a fertőzött személlyel való kontaktust követő 14 napon belül jelentkeztek a tünetek értesítsük a mentőket vagy a kijelölt kórházat



Utazási tervek érintett
területekre, vagy
potencionális kontaktus
fertőzött személyekkel

- Nyugtassuk meg a beteget
- SARS-CoV-2 fertőzés kockázata fennállhat
- Javasoljunk 14 napos otthon tartózkodást (karantént) a hazatérést követően
- Adjunk tájékoztatást a helyzetről és a fertőződés módjairól
- Emeljük ki a preventív intézkedések fontosságát
- Biztosítsunk bizonyítékon alapuló információt és tanácsot szóban és/vagy írásban)



Vannak tünetek
(köhögés, láz vagy
légzési nehézségek)



Utazási előzmény a
közelmúltban az érintett
területekre, vagy kontaktus
fertőzött személyekkel

- Nyugtassuk meg a beteget
- SARS-CoV-2 fertőzés kockázata fennáll
- Lépünk kapcsolatba az egészségügyi hatóságokkal a kezelési protokoll megkezdése érdekében
- Tájékoztassuk az izoláció, diagnózis és a kezelés módjáról
- Emeljük ki a preventív intézkedések fontosságát a fertőzés továbbadásának megakadályozása érdekében
- Biztosítsunk bizonyítékon alapuló információt és tanácsot